LEPIDOPTERA NEOTROPICA

II.—DOS NUEVAS ESPECIES DE NOCTUOIDEA

por

RICARDO N. ORFILA

Cisthene australis nov. sp. (*Lithosiidae*).

Cabeza negro marrón, antenas negras, tegulas negras, hombros amarillos, torax negro, patagia negra.

Ala anterior negra, con una banda mediana amarillo cadmio dilatada sobre el disco, una mancha submarginal cerca del ápice de forma subtriangular y un punto triangular submarginal entre Cu_1 y Cu_2.

Ala posterior negra con una banda mediana excurvada, del margen anterior al margen interno cerca del ángulo anal.

Patas negras.

Abdomen negro, ventralmente amarillo en los segmentos 2-5.

Exp. alar: 30-28 mm.

Holotipo macho n° 252, alotipo hembra n° 253 en mi colección; 8 paratipos en col. Alberto Breyer; 1 paratipo en col. Museo Argentino de Ciencias Naturales.

Distribución: Tandil, Provincia de Buenos Aires, República Argentina.

Se distingue de *C. ruficollis* y *C. argentinensis* por tener las tégulas negras en tanto estas las tienen amarillas; por el abdómen dorsalmente negro en tanto en éstas es amarillo en los segmentos 2-6 con una línea dorsal muy delgada negra.

La clave de Hampson (1900) es insuficiente porque el dilema debe llevar ahora a estas tres especies. Es preciso ampliarlo a cuyos fines he confeccionado la siguiente clave:

a) Tégulas amarillas.
  a) Mancha apical del ala anterior excurvada mancha del ala posterior ocupando casi totalmente el campo basal y extendiéndose hacia el margen externo sobre la mediana tomando forma cuadrangular ..... *C.argentinensis*

b) Mancha apical del ala anterior triangular mancha mediana excurvada y circular ..... *C. ruficollis*
b) Tégulas negras ..... *C. australis*

Esta especie se aproxima a *C. unicincta* y *C. praxis* por su abdomen dorsalmente negro.

Cissura bilineata nov. sp. (*Arctiidae*)

Cabeza y torax pardo azulado, tegulas marginadas frontalmente de carmesí, patagias marginadas de pardo azulado, pecho carmesí, patas pardas, coxas carmesí, un punto blanco en la base del primer artejo tarsal; abdomen carmesí.

Ala anterior parda, una línea costal carmesí que se extiende hasta ¼ de la base entrando en la superficie alar y corriendo subcostalmente hasta el ápice donde se funde con otra línea carmesí que desde 1/3 de la costa antes del ápice recorre el margen interno hasta fusionarse con la faja marginal externa 1/3 abajo del ápice.

Ala posterior parda con el área basal blanquecina.

Exp. alar: 50 mm.

Holotipo hembra, n° 254, en mi colección.

Distribución: Villarrica, Paraguay.

Se parece a *C. decora* y *C. plumbea* pero se distingue de la primera por tener las coxas carmesí y porque la faja subcostal llega hasta el margen y de la segunda en que la línea escarlata que bordea el ala anterior llega hasta el ángulo interno.

Buenos Aires, noviembre 1° de 1935.